

Link do produktu: <https://agropixel.pl/zapachowy-odstraszacz-pacho-lek-na-dziki-p-619.html>



## Zapachowy odstraszacz PACHO-LEK na dziki

Cena brutto	<b>135,00 zł</b>
Cena netto	<b>109,76 zł</b>
Kod producenta	<b>478381496</b>
Numer katalogowy	<b>PH-D</b>
Rodzaj	<b>ZAPACHOWY</b>

### Opis produktu

Zapachowy odstraszacz PACHO-LEK na dziki to idealne rozwiązanie w walce z ryciem i rozkopywaniem pól przez dziki. Tworzy trwałą barierę ochronną dla kukurydzy, ziemniaków, zbóż oraz warzyw i ogródków, chroniąc je przed zniszczeniami spowodowanymi przez dziką zwierzynę. W przypadku afrykańskiego pomoru świń, zalecamy stosowanie preparatu PACHO-LEK. Ogrodzenie zapachowe sprawdza się także w zapewnianiu bezpieczeństwa na drogach i autostradach, zmniejszając ryzyko kolizji z dzikimi zwierzętami.

Pojemność: 250 ml koncentratu zapachowego

### Zalety produktu:

- Skuteczność: Chroni uprawy i sady przed niszczycielską działalnością dzików.
- Wszechstronność: Możliwość zastosowania na różnych rodzajach upraw.
- Łatwość użycia: Proste procedury aplikacji dostosowane do różnych faz wzrostu roślin.

### Zastosowanie i dawkowanie:

#### Kukurydza w okresie siewu:

1. Wstrzyknij preparat PACHO-LEK na dziki w 3 punkty do nośnika BIO10.
2. Rozłóż nośniki w odległości 30 m od siebie, zaczynając od krawędzi pola i przesuując się do środka.

#### Kukurydza we wczesnej fazie wegetacji:

1. Aplikuj koncentrat bezpośrednio do kątów pierwszych dwóch liści przez ok. 1 sekundę.
2. Rozłóż nośniki w odległości 30 m od siebie.

#### Ziemniaki:

1. W okresie tworzenia bulw, wstrzyknąć substancję zapachową do nośnika BIO10 w 3 punktach przez około 1 sekundę.
2. Rozłóż nośniki na polu w odległości 30 m od siebie, zaczynając od krawędzi pola.

#### Groch:

1. W okresie wczesnej wegetacji wstrzyknij preparat do nośnika BIO10 o nieregularnym kształcie w 3 punktach na około 1 sekundę.
2. Rozłóż nośniki na powierzchni pola w odległości 30 m od siebie, postępując od krawędzi pola do środka.

#### Użytki zielone:

- 
1. Wstrzyknąć substancję zapachową do nośnika BIO10 w 3 punktach przez ok. 1 sekundę.
  2. Rozłóż nośniki na obszarze trawy w odległości 30 m od siebie.
  3. Substancja działa do 3 miesięcy. Jeśli konieczne jest przedłużenie ochrony, ponownie nasącz nośnik preparatem.

**Afrykański pomór świń:**

1. Wstrzyknąć substancję zapachową do nośnika BIO10 w 3 punktach na około 1 sekundę.
2. Aplikację odnawiaj co miesiąc. Dla wydłużenia czasu działania zalecamy zastosowanie nośnika z pianki PU.

**Środki ostrożności:**

- Zawsze używaj odzieży ochronnej: rękawiczek gumowych oraz okularów ochronnych.
- Przechowuj koncentrat w suchym i przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Butelkę należy przechowywać w pozycji stojącej.

Zapewnij swoim uprawom skuteczną ochronę z naszym ogrodzeniem zapachowym przeciw dzikom!